

EVC ISQUÉMICO EN TIEMPO DE VENTANA TROMBOLÍTICA (trombolizados) 4% de atención. Trombectomía terapia endovascular menor al **1% de atención.**



PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE

EVC isquémico en ventana trombolítica

- A** Aplicación inmediata de Alteplasa clave 5107 (trombólisis). La dosis recomendada total es de 0,9 mg de alteplasa/kg de peso corporal (hasta un máximo de 90 mg) empezando con un 10% de la dosis total en forma de bolo intravenoso inicial, inmediatamente seguido del resto de la dosis total perfundida por vía intravenosa durante 60 minutos.
- B** **Cerebro protección**, tiempo óptimo de atención 21 días (10 días estancia intrahospitalaria, 11 días proceso ambulatorio) forma de aplicación clave 6209 Cerebrolysin, desde el día 1 al 21 aplicar cada 24 horas: infusión intravenosa 50 ml 5 ampolletas de 10 ml cada una, diluidas en 150 ml de solución salina, tiempo de infusión 30 minutos
- C** 24 horas posteriores a trombólisis adyuvante con **cerebro protección** iniciar **rehabilitación temprana** intrahospitalaria hasta el día 10 y continuar hasta el día 21.

ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN



PLANTEAMIENTO



CEREBROLYSIN
MEC. DE ACCIÓN



ESTUDIOS Y
BIBLIOGRAFÍA